

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Épanchement oreille moyenne chronique



Symptômes

Surdit 

sensation oreille bouch e

enfant



Causes

Multifactoriel



Complications

Complications possibles selon s v rit 



Traitement

Traitement adapt 



Diagnostic diff rentiel

Diagnostic diff rentiel selon contexte clinique



Examens paracliniques

Bilan biologique et imagerie adapt s



Protocole m dicamenteux

Traitement  tiologique et symptomatique



Interpr tation des examens

Interpr ter les r sultats en corr lation avec la clinique

Valeurs normales   v rifier selon les normes du laboratoire

R p ter les examens si r sultats discordants avec la clinique

☐☐ **Prise en charge hospitalière**

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

☐☐☐☐☐ **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.