

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Kyste rénal bénin isolé



Symptômes

- Asymptomatique
- découverte échographique fortuite



Causes

- Multifactoriel



Complications

- Complications possibles selon sévérité



Traitement

- Traitement adapté



Diagnostic différentiel

- Diagnostic différentiel selon contexte clinique



Examens paracliniques

- Bilan biologique et imagerie adaptés



Protocole médicamenteux

Traitement étiologique et symptomatique



Interprétation des examens

- Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique
- Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire
- Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique



☑ **Prise en charge hospitalière**

Prise en charge ambulatoire consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides



☑☑☑☑☑ **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.