

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Épanchement chronique oreille moyenne sans infection.

Symptômes

Hypoacousie bilatérale sensation oreille bouchée

retard langage

Causes

Dysfonction trompe d'Eustache

hypertrophie adénoïdes allergie

Complications

Retard de langage poche de rétraction

cholestéatome

Traitement

Aérateurs transtympaniques adénoïdectomie

Diagnostic différentiel

Otite moyenne aiguë récidivante cholestéatome tumeur cavum

Examens paracliniques

Otoscopie (tympan mat rétracté) audiométrie (surdité transmission) impédancemétrie (tympanogramme plat)

Protocole médicamenteux

Surveillance 3 mois (résolution spontanée 80%); Si persistant: Aérateurs transtympaniques (yoyos); Adénoïdectomie si hypertrophie; Rééducation audiophonologique si retard langage

☐ Interprétation des examens

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.