

Gravité **GRAVE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Fièvre inflammatoire systémique.



Symptômes

Fièvre hectique éruption saumon polyarthralgies
pharyngite splénomégalie



Causes

Auto-inflammatoire cytokines



Complications

SAM amylose insuffisance hépatique



Traitement

Corticoïdes méthotrexate anti-IL1 anti-IL6



Diagnostic différentiel

Lymphome endocardite lupus connectivite infection



Examens paracliniques

NFS (hyperleucocytose+polynucléose) ferritine très élevée (>5x) glycosylée <20% bilan hépatique TG



Protocole médicamenteux

Prednisone 0.5-1mg/kg/j; Méthotrexate 15-25mg/sem si cortico-dépendance; Anakinra 100mg/j SC si résistant; Tocilizumab 8mg/kg IV/4sem; Screening SAM (ferritine, TG, fibrinogène)

☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse

GGT/PAL élevées = cholestase

TP<70% = insuffisance hépatique

☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.