

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Fibrose rétractile aponévrose palmaire.

Symptômes

Nodules palmaires

rétraction doigts en flexion (4ème/5ème)

Causes

Prédisposition génétique nordique

diabète

alcool

épilepsie

Complications

Gêne fonctionnelle

rétraction irréductible

Traitement

Aponévrectomie

collagénase

aponévrotomie à l'aiguille

Diagnostic différentiel

Ténosynovite

kyste synovial

tumeur parties molles

camptodactylie

Examens paracliniques

Clinique (table-top test positif si main ne s'aplatit pas)

pas d'imagerie nécessaire

Protocole médicamenteux

Stade initial: Surveillance; Rétraction >30° MCP ou tout PIP: Aponévrotomie percutanée à l'aiguille ou Collagénase (Xiapex) 0.58mg injection; Rétraction sévère: Aponévrectomie chirurgicale

☐ Interprétation des examens

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.