

Gravité GRAVE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Malabsorption par résection intestinale étendue.



Symptômes

Diarrhée chronique déshydratation dénutrition

carences



Causes

Résection chirurgicale (Crohn infarctus méésentérique

volvulus)



Complications

Dénutrition insuffisance hépatique lithiase IRC



Traitement

Nutrition parentérale téduglutide

transplantation intestinale



Diagnostic différentiel

Maladie coeliaque MICI insuffisance pancréatique SIBO



Examens paracliniques

Citrulline plasmatique (marqueur masse intestinale) bilan nutritionnel complet vitamines oligoéléments DXA



Protocole médicamenteux

Nutrition parentérale cyclique nocturne; Téduglutide 0.05mg/kg/j SC (augmente absorption); IPP (hypersécrétion); Supplémentation: B12, Fer, Ca, Vit D, Zn, Mg; Transplantation si complications NP

☐ Interprétation des examens

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Évaluation nutritionnelle

diététicien

supplémentation si nécessaire

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.