

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Cancer très mauvais pronostic.



## Symptômes

Ictère obstructif

douleur dorsale

amaigrissement rapide

diabète récent



## Causes

Tabac

pancréatite chronique

obésité

diabète



## Complications

Métastases hépatiques

cachexie

obstruction



## Traitement

Chirurgie Whipple

FOLFIRINOX

gemcitabine

soins palliatifs



## Diagnostic différentiel

Pancréatite chronique

cholangiocarcinome

lymphome

tumeur neuroendocrine



## Examens paracliniques

Scanner abdominal injecté

écho-endoscopie + biopsie

IRM pancréatique

CA 19-9

bilan d'extension



## Protocole médicamenteux

Résécable: DPC (Whipple) + FOLFIRINOX adjuvant 6 mois; Localement avancé: FOLFIRINOX ou Gemcitabine+nab-Paclitaxel; Métastatique: FOLFIRINOX si bon état; Soins palliatifs précoces

## ☐☐ Interprétation des examens

Créatinine: Élevée si  $>120\mu\text{mol/L}$  homme

$>100$  femme

Calculer DFG (CKD-EPI)

IRA si élévation aiguë

Scanner: Interpréter avec le contexte clinique

Rechercher collections

masses

épanchements

pneumopéritoine

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication

Gadolinium si tumeur/inflammation

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si  $>3$  mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé  $>75$  ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.