◫ Gravité GRAVE ⚡ URGENCE Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

◫ Définition

Insuffisance hépatique aiguë avec encéphalopathie.

◫ Symptômes

- Ictère rapidement progressif
- encéphalopathie
- coagulopathie
- œdème cérébral

◫ Causes

- Hépatite virale B/A/E
- paracétamol
- auto-immune
- Wilson

⚠ Complications

- Œdème cérébral
- défaillance multiviscérale
- décès 80% sans transplantation

◫ Traitement

- N-acétylcystéine
- transplantation hépatique super-urgente

◫ Diagnostic différentiel

- Syndrome de Budd-Chiari
- stéatose aiguë gravidique
- HELLP
- infiltration maligne

◫ Examens paracliniques

- TP/facteur V (effondré)
- bilan hépatique
- ammoniémie
- paracétamolémie
- sérologies virales
- scanner cérébral
- MELD

◫ Protocole médicamenteux

N-acétylcystéine 150mg/kg IV (même hors paracétamol); Lactulose; Contact centre transplantation immédiat; Inscription super-urgente si facteur V<30% (adulte) ou <20% (enfant); Mannitol si HTIC

Interprétation des examens

- Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse
- GGT/PAL élevées = cholestase
- TP<70% = insuffisance hépatique
- Scanner: Interpréter avec le contexte clinique
- Rechercher collections
- masses
- épanchements
- pneumopéritoine
- Sérologie: IgM = infection récente/aiguë
- IgG = infection ancienne/immunité
- Séroconversion = passage IgM→IgG

Prise en charge hospitalière

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- groupage si hémorragie
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée: constantes/4h
- diurèse horaire si critique
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récidives

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.