

Gravité MOYENNE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Parasitose hépatique par *Echinococcus granulosus*.

Symptômes

Hépatomégalie douleur hypochondre droit

découverte fortuite

Causes

Echinococcus granulosus chien mouton

Complications

Rupture (anaphylaxie) surinfection fistule biliaire

Traitement

Chirurgie (périkystectomie) PAIR albendazole

Diagnostic différentiel

Kyste biliaire simple abcès amibien cancer hépatique hémangiome

Examens paracliniques

Échographie (kyste cloisonné) classification Gharbi sérologie hydatidose NFS (éosinophilie) bilan hépatique

Protocole médicamenteux

Chirurgie: Périkystectomie ou Résection hépatique; PAIR (Ponction-Aspiration-Injection-Réaspiration) si CI chirurgie; Albendazole 10-15mg/kg/j 1-6 mois péri-opératoire; PAS de ponction sans préparation (risque anaphylaxie)

☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse

GGT/PAL élevées = cholestase

TP<70% = insuffisance hépatique

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux

Sérologie: IgM = infection récente/aiguë

IgG = infection ancienne/immunité

Séroconversion = passage IgM→IgG

☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie

bilan pré-op

jeûne

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.