

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Voir Rosacée.

Symptômes

Rougeurs faciales

papulo-pustules

télangiectasies

Causes

Anomalie vasculaire

Demodex

Complications

Rhinophyma

atteinte oculaire

Traitement

Métronidazole topique

doxycycline

Diagnostic différentiel

Acné vulgaire

lupus cutané

dermatite séborrhéique

Examens paracliniques

Clinique

Protocole médicamenteux

Métronidazole 0.75% crème x2/j; Doxycycline 40mg/j 3 mois

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

Valeurs selon normes laboratoire

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

Consultation contrôle 7-14 jours

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.