

Gravité **MOYENNE**

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Tumeur bénigne hépatique.

● Symptômes

Souvent asymptomatique

douleur HCD

rupture hémorragique

● Causes

Contraception orale

stéroïdes anabolisants

● ⚠ Complications

Rupture hémorragique

transformation maligne rare

● Traitement

Arrêt contraception

surveillance

résection si >5cm

● Diagnostic différentiel

CHC

HNF

hémangiome

métastase

● Examens paracliniques

IRM hépatique (prise contraste artérielle

washout)

biopsie si doute

● Protocole médicamenteux

Arrêt contraception; Surveillance IRM/6mois si <5cm; Résection chirurgicale si >5cm ou croissance

☐☐ Interprétation des examens

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2 selon indication

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte ou ambulatoire

Réévaluation 48-72h

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.