

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Chute sévère PNN <500/mm³.



Symptômes

Fièvre

angine ulcéro-nécrotique

infections graves



Causes

Médicamenteuse (antithyroïdiens

clozapine)

chimiothérapie



Complications

Sepsis grave

choc septique

décès



Traitement

ATB large spectre urgente

G-CSF

arrêt médicament



Diagnostic différentiel

Neutropénie fébrile autre

leucémie

aplasie



Examens paracliniques

NFS (PNN<500)

hémocultures

PCT

bilan étiologique



Protocole médicamenteux

Pipéracilline-tazobactam 4g x4/j IV; G-CSF 5µg/kg/j SC; Isolement protecteur; Arrêt médicament causal

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Hb < 12 femme / < 13 homme = anémie

GB > 10000 = infection

Plaquet < 150000 = thrombopénie

☐☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

┆ NOURRISSON (< 2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

┆ ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

┆ ADULTE (> 15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.