

Gravité GRAVE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Dilatation AAA >30mm.

Symptômes

Souvent asymptomatique masse pulsatile

douleur dorsale si rupture

Causes

Athérosclérose HTA tabac

âge >65 ans homme

Complications

Rupture (mortalité 80%) embolie compression

Traitement

Surveillance si <55mm

chirurgie/endoprothèse si >55mm

Diagnostic différentiel

Masse rétropéritonéale lymphome kyste rénal

Examens paracliniques

Écho abdominale (dépistage) angioscanner

Protocole médicamenteux

Surveillance: écho/6mois si 40-55mm; Chirurgie si >55mm: endoprothèse ou pontage; Contrôle PA: BB

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Rechercher collections

masses

épanchements

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

┆ NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

┆ ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

┆ ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.