

Gravité **MOYENNE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

■ Définition

Trouble alimentaire avec crises et purges.

■ Symptômes

Crises hyperphagiques vomissements provoqués
poids normal érosions dentaires

■ Causes

Multifactoriel: psychologique culturel
neurobiologique

⚠ Complications

Hypokaliémie Mallory-Weiss caries
ostéoporose

■ Traitement

TCC ISRS (fluoxétine) nutrition

■ Diagnostic différentiel

Anorexie mentale dépression diabète hyperthyroïdie

■ Examens paracliniques

NFS ionogramme (hypokaliémie) amylase ECG bilan dentaire

■ Protocole médicamenteux

Fluoxétine 60mg/j (seul ISRS avec AMM boulimie); TCC spécialisée 16-20 séances; Correction hypokaliémie; Suivi dentaire

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Hb<12 femme/<13 homme = anémie

GB>10000 = infection

Plaq<150000 = thrombopénie

ECG: Rythme sinusal 60-100/min

Rechercher anomalies ST

ondes Q

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte ou ambulatoire

Réévaluation 48-72h

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

┆ NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

┆ ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

┆ ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.