

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Carcinome épidermoïde de la langue.

Symptômes

Ulcération linguale indurée douleur otalgie réflexe

adénopathie

Causes

Tabac alcool HPV mauvaise hygiène dentaire

Complications

Métastases ganglionnaires dénutrition asphyxie

Traitement

Chirurgie radiothérapie cisplatine

Diagnostic différentiel

Aphte géant lichen érosif leucoplasie tuberculose

Examens paracliniques

Biopsie IRM cervicale TEP-scanner panendoscopie

Protocole médicamenteux

Glossectomie partielle + curage; Radiothérapie adjuvante; Chimiothérapie cisplatine si avancé

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Rechercher collections

masses

épanchements

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2 selon indication

☐☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.