

Gravité **MOYENNE**

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Atteinte oculaire de la toxoplasmose.

## Symptômes

Baisse visuelle myodésopsies œil rouge

douleur modérée

## Causes

Toxoplasma gondii réactivation cycle parasitaire

## Complications

Décollement rétinien cécité si atteinte maculaire

## Traitement

Pyriméthamine+sulfadiazine+acide folinique 6 semaines

## Diagnostic différentiel

Rétinite CMV sarcoïdose oculaire tuberculose syphilis

## Examens paracliniques

Fond d'œil (foyer blanc crémeux) OCT sérologie toxoplasme PCR humeur aqueuse

## Protocole médicamenteux

Pyriméthamine 50mg/j + Sulfadiazine 4g/j + Acide folinique 25mg/j 6 semaines; Corticoïdes: Prednisone 0.5mg/kg/j J3 (après ATB)

## Interprétation des examens

Sérologie: IgM=aigu IgG=ancien/immunité PCR: Haute sensibilité Résultat rapide

## ☑️ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte ou ambulatoire

Réévaluation 48-72h

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

## ☑️☑️☑️☑️ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.