

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Voir Infection à C. difficile.

## Symptômes

Diarrhée aqueuse fétide

fièvre

douleur abdominale

## Complications

Mégacôlon toxique

perforation

décès

## Causes

C. difficile post-antibiothérapie

## Traitement

Vancomycine orale

fidaxomicine

TMF

## Diagnostic différentiel

MICI

colite ischémique

colite infectieuse autre

## Examens paracliniques

Toxines A/B selles

PCR C. difficile

coloscopie (pseudomembranes)

## Protocole médicamenteux

Vancomycine 125mg x4/j PO 10j; Fidaxomicine 200mg x2/j si récurrence; TMF si 3+ récurrences

## Interprétation des examens

PCR: Haute sensibilité

Résultat rapide

## ☑ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

## ☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.