

Gravité **MOYENNE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Forme atrophique de la DMLA.



Symptômes

Baisse visuelle centrale progressive

métamorphopsies

scotome



Causes

Vieillissement

génétique

tabac

lumière bleue



Complications

Cécité centrale

handicap visuel sévère



Traitement

Compléments AREDS2

réhabilitation basse vision



Diagnostic différentiel

DMLA humide

membrane épirétinienne

trou maculaire



Examens paracliniques

Fond d'œil (drusen)

atrophie géographique)

OCT

rétinographie



Protocole médicamenteux

Compléments AREDS2 (vit C+E+zinc+lutéine+zéaxanthine); Rééducation basse vision; Arrêt tabac; Lunettes filtrantes; Pas de traitement curatif



Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

Valeurs selon normes laboratoire

☐☐ **Prise en charge hospitalière**

Hospitalisation courte ou ambulatoire

Réévaluation 48-72h

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.