

Gravité **MOYENNE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Forme atrophique de la DMLA.



## Symptômes

Baisse visuelle centrale progressive

métamorphopsies

scotome



## Causes

Vieillissement

génétique

tabac

lumière bleue



## Complications

Cécité centrale

handicap visuel sévère



## Traitement

Compléments AREDS2

réhabilitation basse vision



## Diagnostic différentiel

DMLA humide

membrane épirétinienne

trou maculaire



## Examens paracliniques

Fond d'œil (drusen)

atrophie géographique)

OCT

rétinographie



## Protocole médicamenteux

Compléments AREDS2 (vit C+E+zinc+lutéine+zéaxanthine); Rééducation basse vision; Arrêt tabac; Lunettes filtrantes; Pas de traitement curatif



## Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

Valeurs selon normes laboratoire

## ☐☐ **Prise en charge hospitalière**

Hospitalisation courte ou ambulatoire

Réévaluation 48-72h

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

## ☐☐☐☐☐ **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.