

Gravité FAIBLE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Réaction cutanée non allergique par irritation directe.

Symptômes

Érythème brûlure desquamation zone contact

Causes

Détergents solvants eau frottements répétés

Complications

Chronicité surinfection eczématisation

Traitement

Éviction irritant émoullients dermocorticoïdes

Diagnostic différentiel

Eczéma allergique psoriasis mycose

Examens paracliniques

Clinique patch-tests négatifs (élimine allergie)

Protocole médicamenteux

Éviction irritant; Émoullients (Dexeryl, CeraVe) x2/j; Dermocorticoïdes si inflammation: Bétaméthasone 0.1% x1/j 5-7j; Gants protection

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique Valeurs selon normes laboratoire

☑️ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

Consultation contrôle 7-14 jours

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☑️☑️☑️☑️ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.