

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Insuffisance hépatique aiguë avec encéphalopathie.



Symptômes

Ictère rapidement progressif

encéphalopathie

coagulopathie

œdème cérébral



Complications

Œdème cérébral

défaillance multiviscérale

décès 80% sans transplantation



Causes

Hépatite virale B/A/E

paracétamol

auto-immune

Wilson



Traitement

N-acétylcystéine

transplantation hépatique super-urgente



Diagnostic différentiel

Syndrome de Budd-Chiari

stéatose aiguë gravidique

HELLP

infiltration maligne



Examens paracliniques

TP/facteur V (effondré)

bilan hépatique

ammoniémie

paracétamolémie

sérologies virales

scanner cérébral

MELD



Protocole médicamenteux

N-acétylcystéine 150mg/kg IV (même hors paracétamol); Lactulose; Contact centre transplantation immédiat; Inscription super-urgente si facteur V <30% (adulte) ou <20% (enfant); Mannitol si HTIC

Interprétation des examens

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse

GGT/PAL élevées = cholestase

TP<70% = insuffisance hépatique

Scanner: Interpréter avec le contexte clinique

Rechercher collections

masses

épanchements

pneumopéritoine

Sérologie: IgM = infection récente/aiguë

IgG = infection ancienne/immunité

Séroconversion = passage IgM→IgG

Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.