◫ Gravité GRAVE ⚡ URGENCE Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

◫ Définition

Ischémie aiguë membre par embolie.

◫ Symptômes

- Douleur brutale membre
- pâleur
- absence pouls
- paresthésies
- paralysie

◫ Causes

- FA
- thrombus cardiaque
- athérome
- anévrisme

⚠ Complications

- Amputation si retard >6h
- rhabdomyolyse
- IRA

◫ Traitement

- Embolectomie urgente
- anticoagulation

◫ Diagnostic différentiel

- TVP
- dissection artérielle
- syndrome compartimental

◫ Examens paracliniques

- Écho-doppler artériel
- angioscanner
- ECG (FA)
- CPK
- lactates

◫ Protocole médicamenteux

Héparine 80UI/kg bolus puis IVSE; Embolectomie Fogarty urgence <6h; Thrombolyse in situ si inaccessible; Fasciotomie si syndrome compartimental

◫ Interprétation des examens

- Scanner: Rechercher collections
- masses
- épanchements
- ECG: Rythme sinusal 60-100/min
- Rechercher anomalies ST
- ondes Q

◫ Prise en charge hospitalière

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu
- Hospitalisation service spécialisé ou réanimation
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique patient et entourage
- Prévention récidives

◫◫◫◫◫ Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.