

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Ischémie aiguë membre par embolie.



Symptômes

Douleur brutale membre

pâleur

absence pouls

paresthésies

paralysie



Complications

Amputation si retard >6h

rhabdomyolyse

IRA



Causes

FA

thrombus cardiaque

athérome

anévrisme



Traitement

Embolectomie urgente

anticoagulation



Diagnostic différentiel

TVP

dissection artérielle

syndrome compartimental



Examens paracliniques

Écho-doppler artériel

angioscanner

ECG (FA)

CPK

lactates



Protocole médicamenteux

Héparine 80UI/kg bolus puis IVSE; Embolectomie Fogarty urgence <6h; Thrombolyse in situ si inaccessible; Fasciotomie si syndrome compartimental



Interprétation des examens

Scanner: Rechercher collections

masses

épanchements

ECG: Rythme sinusal 60-100/min

Rechercher anomalies ST

ondes Q



Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives



Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

 **Avertissement** :  GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.