

Gravité **GRAVE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Troubles neurologiques par insuffisance hépatique.



Symptômes

Confusion astérisis (flapping tremor)
inversion rythme nyctéméral coma



Causes

Cirrhose décompensée shunt porto-systémique



Complications

Coma hépatique décès récidives



Traitement

Lactulose rifaximine
traitement facteur déclenchant



Diagnostic différentiel

Encéphalopathie métabolique AVC méningite intoxication



Examens paracliniques

Ammoniémie (non corrélée sévérité) EEG (ondes triphasiques) bilan hépatique recherche facteur déclenchant



Protocole médicamenteux

Lactulose 30ml x3-4/j (objectif 2-3 selles/j); Rifaximine 550mg x2/j; Traiter déclenchant (infection, hémorragie, constipation); Régime protéines végétales

☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

Valeurs selon normes laboratoire

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.