

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Dermo-hypodermite nodulaire des jambes.



## Symptômes

Nodules rouges douloureux face antérieure jambes

fièvre

arthralgies



## Causes

Sarcoïdose

streptocoque

Crohn

tuberculose

médicaments

Behçet



## Complications

Bénin

résolution spontanée en 3-8 semaines



## Traitement

Repos

AINS

traitement cause



## Diagnostic différentiel

Cellulite

érysipèle

PAN cutanée

panniculite



## Examens paracliniques

NFS

CRP/VS élevées

IDR tuberculine

radio thoracique (sarcoïdose)

ASLO



## Protocole médicamenteux

Repos au lit (accélère guérison); AINS: Ibuprofène 400mg x3/j; Compression élastique; Bilan étiologique complet; Traiter cause sous-jacente

## ☐☐ Interprétation des examens

NFS: Hb<12 femme/<13 homme = anémie

GB>10000 = infection

Plaq<150000 = thrombopénie

CRP>5 = inflammation

>100 = infection bactérienne probable

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

Consultation contrôle 7-14 jours

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

┆ NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

┆ ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

┆ ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.