

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Tumeur bénigne hépatique la plus fréquente.



## Symptômes

Asymptomatique

découverte fortuite

douleur si volumineux



## Causes

Malformation vasculaire

estrogènes



## Complications

Rupture hémorragique rare

effet masse si géant



## Traitement

Surveillance

embolisation/résection si symptomatique



## Diagnostic différentiel

CHC

métastase

adénome

HNF



## Examens paracliniques

IRM hépatique (rehaussement en motte centripète

rétenion T2)

écho Doppler



## Protocole médicamenteux

Surveillance simple si asymptomatique (pas de dégénérescence); Embolisation artérielle si symptomatique; Résection si >10cm ou compression; PAS de biopsie (risque hémorragie)



## Interprétation des examens

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2 selon indication

## ☑️ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

Consultation contrôle 7-14 jours

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

## ☑️☑️☑️☑️ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.