

Gravité GRAVE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Surcharge fer acquise.



Symptômes

Fatigue mélanodermie hépatomégalie diabète



Causes

Transfusions répétées (thalassémie MDS)

dysérythropoïèse



Complications

Cirrhose cardiomyopathie diabète



Traitement

Chélation fer



Diagnostic différentiel

Hémochromatose génétique stéatose hépatite alcoolique



Examens paracliniques

Ferritine très élevée CST IRM hépatique (surcharge quantifiée) génétique HFE négative



Protocole médicamenteux

Déférasirox 20-40mg/kg/j PO; ou Déféroxamine 40mg/kg/j SC perfusion 8-12h; Cible ferritine <1000µg/L; Saignées impossibles si anémie chronique



Interprétation des examens

IRM: Meilleure résolution tissulaire Séquences T1/T2 selon indication

☑️ **Prise en charge hospitalière**

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☑️☑️☑️☑️ **Protocole par tranche d'âge**

👉 **NOURRISSON (<2 ans):** Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

👉 **ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

👉 **ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠️ **Avertissement :** ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.