

Gravité MOYENNE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

T° <36°C chez nouveau-né.



Symptômes

Peau froide marbrée

léthargie

hypoglycémie

bradycardie



Causes

Prématurité

petit poids

salle accouchement froide



Complications

Hypoglycémie

acidose

hémorragie

décès



Traitement

Réchauffement progressif

peau-à-peau

incubateur



Diagnostic différentiel

Sepsis néonatal

hypothyroïdie

insuffisance surrénale



Examens paracliniques

Température axillaire <36°C

glycémie

gazométrie

NFS/CRP



Protocole médicamenteux

Réchauffement: Incubateur 36-37°C ou Peau-à-peau (kangourou); Correction hypoglycémie: G10% 2ml/kg IV; Surveillance glycémie/4h; Rechercher infection si associée à léthargie

☐ Interprétation des examens

NFS: Hb < 12 femme / < 13 homme = anémie

GB > 10000 = infection

Plaquet < 150000 = thrombopénie

CRP > 5 = inflammation

> 100 = infection bactérienne probable

☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu

Hospitalisation courte ou ambulatoire

Réévaluation 48-72h

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

┆ NOURRISSON (< 2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

┆ ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

┆ ADULTE (> 15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.