

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Tumeur bénigne cutanée la plus fréquente.



Symptômes

Lésion brunâtre posée

aspect gras

surface cérébriforme



Causes

Vieillissement

prédisposition génétique



Complications

Aucune (bénin)

confusion avec mélanome



Traitement

Abstention

cryothérapie ou curetage si gênant



Diagnostic différentiel

Mélanome

basocellulaire

verru

kératose actinique



Examens paracliniques

Dermoscopie (aspect cérébriforme)

biopsie si doute



Protocole médicamenteux

Abstention; Cryothérapie azote liquide si esthétique; Curetage si volumineux; Signe de Leser-Trélat: rechercher cancer si apparition brutale multiple



Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

Valeurs selon normes laboratoire

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

Consultation contrôle 7-14 jours

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.