

Gravité FAIBLE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Malformation congénitale canal thyroglosse.



## Symptômes

Masse cervicale médiane ascension déglutition

surinfection possible



## Causes

Persistance canal thyroglosse



## Complications

Surinfection fistulisation transformation rare



## Traitement

Chirurgie (intervention de Sistrunk)



## Diagnostic différentiel

Kyste dermoïde adénopathie goitre tumeur thyroïde



## Examens paracliniques

Échographie cervicale TSH (vérifier thyroïde eutopique) scanner si doute



## Protocole médicamenteux

Intervention de Sistrunk: Excision kyste + corps hyoïde médian + trajet jusqu'au foramen caecum; Si infecté: ATB puis chirurgie à froid 6 semaines après



## Interprétation des examens

Scanner: Rechercher collections masses épanchements

## ☑️ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

Consultation contrôle 7-14 jours

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

## ☑️☑️☑️☑️ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.