

Gravité **GRAVE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Maladie auto-immune bulleuse sujet âgé.

Symptômes

Bulles tendues sur base urticarienne prurit

respecte muqueuses

Causes

Anticorps anti-BPAG1/BPAG2 auto-immune

Complications

Surinfection déshydratation

décès (10-30% sujet âgé)

Traitement

Dermocorticoïdes forte dose dapsone

Diagnostic différentiel

Pemphigus vulgaire érythème polymorphe toxidermie bulleuse

Examens paracliniques

Biopsie (bulle sous-épidermique) IFD (IgG+C3 linéaire JDE) anti-BP180/BP230

Protocole médicamenteux

Clobétasol 0.05% crème 10-30g/j selon surface; Dose décroissance sur 12 mois; Si étendu/résistant: Dapsone 50-100mg/j; Méthotrexate 7.5-15mg/sem si cortico-résistant

☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

Valeurs selon normes laboratoire

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

┆ NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

┆ ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

┆ ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.