

Gravité GRAVE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

Définition

Atteinte du plexus brachial.

Symptômes

Douleur épaule/bras

paralyisie

amyotrophie

troubles sensitifs

Causes

Traumatisme (accident moto)

Pancoast-Tobias

post-radique

névralgique

Complications

Paralyisie permanente

douleur chronique

Traitement

Kinésithérapie

chirurgie microchirurgicale

traitement cause

Diagnostic différentiel

Radiculopathie cervicale

SLA

syringomyélie

syndrome canalaire

Examens paracliniques

EMG (dénervation plexus)

IRM plexus+cervicale

scanner thorax si Pancoast

Protocole médicamenteux

Traumatique: Exploration chirurgicale à 3-6 mois si pas de récupération; Névrite: Prednisone 1mg/kg/j 2 sem; Tumorale: Traitement cancer; Kinésithérapie intensive

☐ Interprétation des examens

Scanner: Rechercher collections

masses

épanchements

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2 selon indication

☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.