

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Pneumonie par aspiration contenu gastrique.

## Symptômes

Fièvre    toux    dyspnée après fausse route

crépitants base droite

## Complications

Abcès pulmonaire    SDRA    décès

## Diagnostic différentiel

Pneumonie communautaire    embolie pulmonaire    OAP

## Examens paracliniques

Radio/scanner thoracique (infiltrat lobe inférieur droit)    NFS/CRP    ECBC

## Protocole médicamenteux

Amoxicilline-clavulanate 1g x3/j IV + Métronidazole 500mg x3/j; Kinésithérapie respiratoire; Prévention: Position 30°, évaluation déglutition

## Causes

Troubles déglutition    coma    vomissements

anesthésie

## Traitement

ATB couvrant anaérobies    kinésithérapie

## ☐ Interprétation des examens

NFS: Hb < 12 femme / < 13 homme = anémie

GB > 10000 = infection

Plaquet < 150000 = thrombopénie

CRP > 5 = inflammation

> 100 = infection bactérienne probable

Scanner: Rechercher collections

masses

épanchements

## ☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

## ☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (< 2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (> 15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.