

## Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

### Définition

Ulcération neutrophilique cutanée.

### Symptômes

Ulcère douloureux extensif bords violacés pathergie

### Causes

MICI hémopathie PR idiopathique

### Complications

Extension surinfection cicatrices

### Traitement

Corticoïdes ciclosporine anti-TNF

PAS de chirurgie

### Diagnostic différentiel

Ulcère veineux/artériel ecthyma vascularite

### Examens paracliniques

Biopsie bords (infiltrat PNN) diagnostic d'exclusion bilan associé

### Protocole médicamenteux

Clobétasol topique; Prednisone 1mg/kg/j; Ciclosporine 3-5mg/kg/j; PAS de chirurgie (pathergie)

### Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique Valeurs selon normes laboratoire

## ☑️ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

## ☑️☑️☑️☑️ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.