

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Tumeur osseuse maligne enfant/adolescent.

Symptômes

Douleur osseuse progressive tuméfaction fièvre

fracture pathologique

Causes

Translocation t(11 22)

cellules neuroectodermiques

Complications

Métastases pulmonaires/osseuses récurrence

Traitement

Chimiothérapie + chirurgie/radiothérapie

Diagnostic différentiel

Ostéomyélite ostéosarcome lymphome osseux granulome éosinophile

Examens paracliniques

Radio (aspect en pelure d'oignon) IRM locale biopsie (petites cellules rondes) scanner/TEP extension

biologie moléculaire

Protocole médicamenteux

Chimiothérapie néoadjuvante: VDC/IE alternés (Vincristine+Doxorubicine+Cyclophosphamide / Ifosfamide+Étoposide) 6 cycles; Chirurgie conservatrice ou radiothérapie; Chimio adjuvante

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Rechercher collections

masses

épanchements

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2 selon indication

☐☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.