

Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Thrombophilie auto-immune avec thromboses et fausses couches.



Symptômes

Thromboses artérielles/veineuses récurrentes

fausses couches à répétition



Causes

Anticorps antiphospholipides (anticardiolipine

anti-β2GP1

anticoagulant lupique)



Complications

Catastrophic APS

AVC jeune

thromboses multisites



Traitement

Anticoagulation au long cours

aspirine

hydroxychloroquine



Diagnostic différentiel

Thrombophilie héréditaire

MICI

cancer

héparine-induced



Examens paracliniques

Anticardiolipines IgG/IgM

anti-β2GP1

anticoagulant lupique (confirmé à 12 semaines)



Protocole médicamenteux

AVK au long cours INR 2-3 (thrombose veineuse) ou 3-4 (artérielle); Grossesse: Héparine + Aspirine 100mg/j; Hydroxychloroquine 200mg x2/j; PAS d'AOD (contre-indiqués)

☐☐ Interprétation des examens

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2 selon indication

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.