

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Voir Canal carpien. Compression nerf médian.

Symptômes

Paresthésies nocturnes 3 premiers doigts

douleur main

Causes

Mouvements répétitifs

grossesse

hypothyroïdie

Complications

Atrophie thénar irréversible

Traitement

Attelle

infiltration

chirurgie

Diagnostic différentiel

Radiculopathie C6-C7

neuropathie ulnaire

Examens paracliniques

EMG/VCN

radio poignet si doute

Protocole médicamenteux

Attelle nocturne 3 mois; Infiltration corticoïdes; Chirurgie endoscopique si échec ou EMG sévère

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

Valeurs selon normes laboratoire

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

Consultation contrôle 7-14 jours

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.