

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Obstruction veines sus-hépatiques.



Symptômes

Hépatomégalie douloureuse

ascite

ictère



Causes

Thrombophilie

syndrome myéloprolifératif

contraception



Complications

Insuffisance hépatique

encéphalopathie

décès



Traitement

Anticoagulation

TIPS

transplantation si sévère



Diagnostic différentiel

Cirrhose

IC droite

péricardite constrictive

maladie veino-occlusive



Examens paracliniques

Écho-doppler hépatique (thrombus veines hépatiques)

scanner/IRM

bilan thrombophilie

NEM/JAK2



Protocole médicamenteux

Anticoagulation héparine puis AVK long cours; TIPS si résistant; Transplantation hépatique si fulminant; Traiter cause (NEM: Hydroxyurée)

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Rechercher collections

masses

épanchements

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2 selon indication

☐☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.