

## Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

### ● Définition

TSPT sévère avec dysrégulation émotionnelle.

### ● Symptômes

Reviviscences évitement

hypervigilance + dysrégulation émotionnelle

identité négative

### ● Causes

Traumatismes répétés/prolongés (violence chronique

maltraitance)

### ● ⚠ Complications

Addictions troubles personnalité somatisation

suicide

### ● Traitement

TCC trauma EMDR thérapie schéma

### ● Diagnostic différentiel

Trouble borderline dépression trouble dissociatif TAG

### ● Examens paracliniques

Clinique (CIM-11) ITQ questionnaire éliminer organique

### ● Protocole médicamenteux

ISRS: Sertraline 50→200mg/j; Psychothérapie phase (stabilisation→trauma→intégration); EMDR; Si cauchemars: Prazosine 1→10mg/j; Stabilisation émotionnelle avant exposition

## ☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

Valeurs selon normes laboratoire

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation service spécialisé ou réanimation

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique patient et entourage

Prévention récidives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

┆ NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg strictes; Paracétamol 15mg/kg/6h max; PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

┆ ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées poids; Formes sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h

┆ ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions; Adapter si IR/IH; Sujet âgé: réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.