

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Collection rétropéritonéale dans le psoas.

Symptômes

Douleur inguinale/lombalgie

fièvre

psoïtis

Causes

Spondylodiscite

Crohn

appendicite

tuberculose

Complications

Sepsis

compression urétérale

Traitement

ATB IV prolongée

drainage percutané

Diagnostic différentiel

Appendicite

hernie inguinale

abcès rénal

Examens paracliniques

Scanner abdominal

hémocultures

NFS/CRP

Protocole médicamenteux

Ceftriaxone 2g/j + Métronidazole IV; Drainage percutané guidé; Durée ATB 4-6 semaines

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie

GB>10000=infection

Pla<150000=thrombopénie

CRP>5=inflammation

>100=bactérien

Scanner: Collections

masses

épanchements

☐☐ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.