

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Hyperpigmentation cutanée associée résistance insuline.



Symptômes

Plaques brunes veloutées cou

aisselles

aines



Causes

Résistance insuline

obésité

cancer (paranéoplasique)



Complications

Marqueur syndrome métabolique

cancer si brutal



Traitement

Perte poids

traitement cause

rétinoïdes topiques



Diagnostic différentiel

Intertrigo

dermatite séborrhéique

infection fongique



Examens paracliniques

Glycémie

HbA1c

insulinémie

scanner si forme paranéoplasique



Protocole médicamenteux

Traitement résistance insuline: Metformine + perte poids; Paranéoplasique: Traiter cancer



Interprétation des examens

Scanner: Collections

masses

épanchements

☑ Prise en charge hospitalière

Ambulatoire

contrôle 7-14j

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.