

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Acidose métabolique par excès lactates.

Symptômes

Dyspnée de Kussmaul confusion choc

marbrures

Causes

Choc metformine+IR sepsis

ischémie mésentérique

Complications

Défaillance multiviscérale arrêt cardiaque

Traitement

Traitement cause remplissage

épuration extra-rénale

Diagnostic différentiel

Acidocétose intoxication méthanol/éthylène glycol

Examens paracliniques

Gazométrie (pH<7.35 lactates>2mmol/L ionogramme (trou anionique élevé)

Protocole médicamenteux

Traiter la cause; Remplissage vasculaire; Bicarbonates 14% si pH<7.1; Hémodialyse si metformine; PAS de bicarbonates systématiques

☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☐☐ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avvertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.