

Gravité **MOYENNE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Voir HBP.

## Symptômes

Dysurie pollakiurie nycturie jet faible

## Causes

Vieillessement hormonal

## Complications

Rétention aiguë IRC

## Traitement

Alpha-bloquants inhibiteurs 5 $\alpha$ R RTUP

## Diagnostic différentiel

Cancer prostate prostatite sténose urétrale

## Examens paracliniques

PSA toucher rectal écho débitmétrie IPSS

## Protocole médicamenteux

Tamsulosine 0.4mg/j; Finastéride 5mg/j si >40ml

## Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.