

Gravité MOYENNE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Ganglion cervical augmenté de volume.

Symptômes

Masse cervicale douleur fièvre si infectieux

Causes

Infectieux cancer ORL lymphome tuberculose

Complications

Extension locale compression

Traitement

Traitement étiologique

Diagnostic différentiel

Kyste branchial lipome tumeur parotide thyroïde

Examens paracliniques

Échographie + cytoponction NFS LDH IDR scanner si doute

Protocole médicamenteux

ATB si bactérien; Biopsie si >3cm ou >4 semaines sans cause; PAS de corticoïdes avant diagnostic

Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie GB>10000=infection Plaq<150000=thrombopénie Scanner: Collections masses épanchements

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.