

Gravité MOYENNE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Hypersensibilité aux bêta-lactamines.

## Symptômes

Urticaire anaphylaxie éruption retardée

## Causes

IgE-médiée (immédiate) ou retardée

## Complications

Anaphylaxie choc

## Traitement

Éviction alternatives ATB désensibilisation

## Diagnostic différentiel

Réaction non allergique intolérance éruption virale

## Examens paracliniques

Tests cutanés pénicilline (prick+IDR) IgE spécifiques test provocation oral

## Protocole médicamenteux

Éviction: Azithromycine ou Fluoroquinolone comme alternatives; 90% des patients étiquetés ne sont PAS allergiques; Test cutanés + provocation pour délabeler

## Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑️ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☑️☑️☑️☑️ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.