

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Incompatibilité Rh mère-fœtus.

## Symptômes

Anémie fœtale

ictère néonatal

anasarque

## Causes

Anti-D maternel

mère Rh- fœtus Rh+

## Complications

Anasarque fœtale

mort in utero

ictère nucléaire

## Traitement

Anti-D prophylaxie

transfusion in utero

exsanguino-transfusion

## Diagnostic différentiel

Ictère physiologique

infection congénitale

incompatibilité ABO

## Examens paracliniques

RAI

Coombs direct

bilirubine

Doppler ACM fœtal (vélocité=anémie)

## Protocole médicamenteux

Anti-D (Rhophylac) 300µg IM à 28 SA + post-partum si nouveau-né Rh+; Transfusion in utero si anémie fœtale; Exsanguino-transfusion si ictère sévère

## Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.