

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Cécité monoculaire transitoire.

Symptômes

Perte visuelle brutale monoculaire durant secondes à minutes

Complications

AVC dans les 90 jours (15%)

récidive

Causes

Embolie rétinienne (sténose carotide)

FA

Traitement

Aspirine

statine

endarterectomie si sténose >70%

Diagnostic différentiel

AIT

migraine avec aura

Horton

hypertension maligne

Examens paracliniques

Fond d'œil (embole visible)

échodoppler carotidien

ECG (FA)

angioscanner

Protocole médicamenteux

Aspirine 300mg immédiat puis 75mg/j; Atorvastatine 80mg/j; Échodoppler TSA urgent; Endarterectomie si sténose >70% symptomatique dans les 2 semaines

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Collections

masses

épanchements

ECG: Rythme

ST

ondes Q

conduction

☐☐ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avvertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.