

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Œil paresseux, déficit développemental vision.



Symptômes

Baisse acuité visuelle unilatérale sans lésion organique



Causes

Strabisme

anisométrie

privation (cataracte congénitale)



Complications

Perte vision définitive après 7-8 ans



Traitement

Occlusion œil sain

correction optique précoce



Diagnostic différentiel

Tumeur rétinienne

neuropathie optique

rétinopathie



Examens paracliniques

Acuité visuelle

réfraction

examen lampe à fente

fond d'œil



Protocole médicamenteux

Correction optique complète; Occlusion œil directeur 2-6h/j; Pénalisation atropine 1% œil sain; Avant 7 ans (période critique plasticité)



Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Ambulatoire

contrôle 7-14j

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.