

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Voir Angiocholite. Infection voies biliaires.

Symptômes

Triade Charcot: fièvre ictère douleur HCD

Causes

Calcul cholédoque sténose biliaire

Complications

Choc septique abcès hépatique

Traitement

ATB IV + CPRE urgente

Diagnostic différentiel

Cholécystite hépatite pancréatite cancer voies biliaires

Examens paracliniques

NFS CRP bilan hépatique cholestase échographie cholangio-IRM

Protocole médicamenteux

Pipéracilline-tazobactam 4g x3/j IV; CPRE sphinctérotomie urgente; Cholécystectomie à distance

Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie GB>10000=infection Plaq<150000=thrombopénie CRP>5=inflammation

>100=bactérien IRM: T1/T2/FLAIR selon indication

☑ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.