

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Déficit inhibiteur C1 estérase.

Symptômes

Œdèmes sous-cutanés récidivants

douleurs abdominales

œdème laryngé

Causes

Déficit C1-INH

autosomique dominant

Complications

Œdème laryngé asphyxiant

douleur abdominale pseudo-chirurgicale

Traitement

Icatibant

C1-INH concentré

danazol

Diagnostic différentiel

Allergie

angio-œdème IEC

urticaire

Examens paracliniques

C4 bas (dépistage)

C1-INH antigène+fonctionnel

C1q (normal si héréditaire)

Protocole médicamenteux

Crise: Icatibant 30mg SC ou C1-INH concentré 20 UI/kg IV; Prophylaxie: Lanadelumab 300mg/2sem SC; JAMAIS d'adrénaline seule; PAS d'IEC à vie

☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☐☐ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avvertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.